

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED OPERACÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY.

tel.č. 566 512 323, 566 512 360

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

ZP:

Diagnoza:

Operace:

Datum nástupu k operaci:

Vážená paní, Vážený pane,
jste objednan/a do naší nemocnice k operaci totální endoprotézy. K tomu, aby jste mohl/a být operován/a požadujeme následující:

- 1) v den nástupu se dostavte mezi 8-10 hodinou na ortopedickou ambulanci Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišťích.
- 2) měsíc před operací požadujeme vyšetření moči na kultivaci a citlivost, eventuálně přeléčení pozitivního močového nálezu.
- 3) **10-14 dnů před termínem operace si nechte zhotovit interní předoperační vyšetření.**
Vyšetření musí zahrnovat: FW, KO, CRP, jaterní soubor, Urea, krea, ionty, gly, koagulace, krevní skupinu + originální výsledek, HbsAg, moč na k+c !!!
Popis EKG křivky, snímek srdce a plic a závěr s doporučením k operaci. V případě plicního onemocnění spirometrii s vyjádřením plicního lékaře a v případě srdečního onemocnění ECHO srdce s vyjádřením kardiologa k plánované operaci.
- 4) Do nemocnice si vezměte s sebou:
kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pyžamo nebo noční košili, osobní potřeby, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, zubní protézu), pevnou obuv (botasky, polobotky, atd.), dlouhou nazouvací lžici pro usnadnění obouvání, francouzské hole (1 pár), trvale užívané léky v originálním balení, **elastické kompresivní punčochy** (u operace kyčle vysoké polostehenní , u operace kolene podkolenky). Je **možno zakoupit je na oddělení**.
- 5) Užíváte-li **Warfarin**, vysaďte ho týden před operací a aplikujte **nízkomolekulární heparin**.
Léky, zvyšující krvácivost - kyselina acetylsalicylová (**Anopyrin, Acylpyrin, Godasal**) nebo nesteroidní antirevmatika(Diclofenac, Ibalgin, Nimesil atd), vysaďte 14 dnů před operací. Ostatní medikaci užívejte v zavedené dávce až do operace. Antikoncepci je nutné měsíc před operací vysadit!
- 6) Z důvodu monitorace v průběhu operace a pooperační péče na JIP je **nutné odstranit gelové nehty/ popř. odlakovat nehty na ruku**. Doporučujeme odlakovat/odstranit gelové nehty i na nohou z důvodu rizika jejich poškození používanou dezinfekcí.
- 7) Po propuštění do domácího léčení budete potřebovat dočasně pomoc druhé osoby (nákupy, vaření ...)
- zajistěte si, kdo se o Vás postará.
Věnujte prosím přípravě na operaci mimořádnou pozornost. Při nejasnostech se poradte s praktickým lékařem, abychom nebyli nuceni operaci odložit.
V případě nejasností nás kdykoliv kontaktujte na tel.: 566 512 323